

# MATEMATICAS II EXAMENES RESUELTOS



**EVAU SEPTIEMBRE 2017**  
**- Extraordinario -**

<https://aprendeconmigomelon.com>

Iñigo Zunzunegui Monterrubio





# Septiembre 2017

## OPCIÓN A

### Ejercicio 1 (3 puntos)

Dada la función  $f(x) = \begin{cases} xe^{2x} & \text{si } x < 0 \\ \frac{\ln(x+1)}{x+1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ , donde  $\ln$  significa logaritmo neperiano, se pide:

a) (1 punto) Estudiar la continuidad y derivabilidad de  $f(x)$  en  $x = 0$ .

b) (1 punto) Calcular  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

c) (1 punto) Calcular  $\int_{-1}^0 f(x) dx$ .

*(Madrid - Matemáticas II - Septiembre 2017 - Opción A)*

### Solución.

a) ■ Continuidad en  $x = 0$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} xe^{2x} = 0$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x+1} = 0$$

$$\bullet f(0) = \frac{\ln(0+1)}{0+1} = 0$$

Como  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$  la función  $f(x)$  es continua en  $x = 0$ .

■ Derivabilidad en  $x = 0$

$$f'(x) = \begin{cases} (2x+1) \cdot e^{2x} & \text{si } x < 0 \\ \frac{1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2} & \text{si } x > 0 \end{cases} \implies \begin{array}{ll} f'(0^-) = 1 & \\ f'(0^+) = 1 & \end{array}$$

Como  $f'(0^-) = f'(0^+)$  la función  $f(x)$  es derivable en  $x = 0$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -xe^{-2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{e^{2x}} = \left[ \frac{\infty}{\infty} \right] \stackrel{L'Hop}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{2e^{2x}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1} = \left[ \frac{\infty}{\infty} \right] \stackrel{L'Hop}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x+1}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1} = 0$$

$$c) \int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 xe^{2x} dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x \Rightarrow du = dx \\ dv = e^{2x} dx \Rightarrow v = \frac{1}{2} \cdot e^{2x} \end{array} \right\}$$

$$= \left. \frac{x}{2} \cdot e^{2x} \right|_{-1}^0 - \int_{-1}^0 \frac{1}{2} \cdot e^{2x} dx = \left. \frac{x}{2} \cdot e^{2x} - \frac{1}{4} \cdot e^{2x} \right|_{-1}^0 = \left. \frac{e^{2x}}{4} \cdot (2x-1) \right|_{-1}^0$$

$$= -\frac{1}{4} + \frac{3}{4e^2} = \frac{3-e^2}{4e^2}$$

————— ○ —————

## Ejercicio 2 (3 puntos)

Dadas las rectas  $r_1 \equiv \begin{cases} 6x - y - z = 1 \\ 2x - y + z = 1 \end{cases}$  y  $r_2 \equiv \begin{cases} 3x - 5y - 2z = 3 \\ 3x + y + 4z = 3 \end{cases}$ , se pide:

- a) (1 punto) Estudiar la posición relativa de  $r_1$  y  $r_2$ .
- b) (1 punto) Calcular la distancia entre las dos rectas.
- c) (1 punto) Hallar la ecuación del plano que contiene a  $r_1$  y al punto  $P(1, 2, 3)$ .

(Madrid - Matemáticas II - Septiembre 2017 - Opción A)

**Solución.**

a)

$$\left. \begin{array}{l} r_1 \equiv \begin{cases} R_1(0, -1, 0) \\ \vec{d}_{r_1} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 6 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-2, -8, -4) \approx (1, 4, 2) \end{cases} \\ r_2 \equiv \begin{cases} R_2(1, 0, 0) \\ \vec{d}_{r_2} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -5 & -2 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = (-18, -18, 18) \approx (1, 1, -1) \end{cases} \\ \left[ \vec{R}_1 \vec{R}_2, \vec{d}_{r_1}, \vec{d}_{r_2} \right] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \implies r_1 \text{ y } r_2 \text{ se cruzan.} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{R}_1 \vec{R}_2 = (1, 1, 0)$$

b)  $d(r_1, r_2) = \frac{\left| [\vec{R}_1 \vec{R}_2, \vec{d}_{r_1}, \vec{d}_{r_2}] \right|}{\left| \vec{d}_{r_1} \times \vec{d}_{r_2} \right|} = \frac{|-3|}{\left| \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \right|} = \frac{3}{|(-6, 3, -3)|} = \frac{3}{\sqrt{54}} = \frac{\sqrt{6}}{6} u$

c)  $\pi \equiv \begin{cases} P(1, 2, 3) \in r_1 \\ r_1 \in \pi \implies \begin{cases} \vec{u} = \vec{d}_{r_1} = (1, 4, 2) \\ \vec{v} = \vec{R}_1 \vec{P} = (1, 3, 3) \end{cases} \end{cases} \implies \pi = [\vec{P} \vec{X}, \vec{u}, \vec{v}] = 0$

$$\left| \begin{matrix} x-1 & y-2 & z-3 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{matrix} \right| = 6 \cdot (x-1) - (y-2) - (z-3) = 0 \Rightarrow \boxed{\pi \equiv 6x - y - z - 1 = 0}$$

————— o —————

### Ejercicio 3 (2 puntos)

Se dispone de tres aleaciones A, B y C que contienen, entre otros metales, oro y plata en las proporciones indicadas en la tabla adjunta.

	Oro(%)	Plata(%)
A	100	0
B	75	15
C	60	22

Se quiere obtener un lingote de 25 gramos con una proporción del 72% de oro y una proporción del 16% de plata, tomando  $x$  gramos de A,  $y$  gramos de B y  $z$  gramos de C. Determínense las cantidades  $x, y, z$ .

(Madrid - Matemáticas II - Septiembre 2017 - Opción A)

#### Solución.

El lingote tendrá  $0.72 \cdot 25 = 18$  gramos de oro y  $0.16 \cdot 25 = 4$  gramos de plata. Teniendo en cuenta las proporciones de la tabla escribimos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 25 \\ x + 0.75y + 0.6z = 18 \\ 0.15y + 0.22z = 4 \end{cases} \implies \begin{cases} x + y + z = 25 \\ 20x + 15y + 12z = 360 \\ 15y + 22z = 400 \end{cases}$$

$$A | A^* = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 25 \\ 20 & 15 & 12 & 360 \\ 0 & 15 & 22 & 400 \end{array} \right) \sim \left[ \begin{array}{c} x+y+z=25 \\ F_2 - 20F_1 \\ F_3 + 3F_2 \end{array} \right] \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 25 \\ 0 & -5 & -8 & -140 \\ 0 & 15 & 22 & 400 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 25 \\ 0 & 1 & 2 & 28 \\ 0 & -5 & -8 & -140 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 25 \\ 0 & 1 & 2 & 28 \\ 0 & 0 & -2 & -120 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{array}{l} x + 12 + 10 = 25 \\ -5y - 8 \cdot 10 = -140 \\ -2z = -20 \end{array} \Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} x = 3 \\ y = 12 \\ z = 10 \end{array}}$$

\_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_

#### Ejercicio 4 (2 puntos)

Dados dos sucesos,  $A$  y  $B$ , de un experimento aleatorio, con probabilidades:

$$P(A) = \frac{4}{9} \quad \& \quad P(B) = \frac{1}{2} \quad \& \quad P(A \cup B) = \frac{2}{3}$$

- (1 punto) Comprobar si los sucesos  $A$  y  $B$  son independientes o no.
- (1 punto) Calcular  $P(\overline{A} | B)$ , donde  $\overline{A}$  denota el suceso complementario de  $A$ .

(Madrid - Matemáticas II - Septiembre 2017 - Opción A)

**Solución.**

a)  $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{4}{9} + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = \frac{5}{18}$   
 $P(A) \cdot P(B) = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{18}$

Como  $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B) \implies$  los sucesos  $A$  y  $B$  no son independientes

b)  $P(\overline{A} | B) = \frac{P(\overline{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{5}{18}}{\frac{1}{2}} = \frac{4}{9}$

————— o —————

# Septiembre 2017

## OPCIÓN B

### Ejercicio 1 (3 puntos)

Dada la matriz  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  y la matriz identidad  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , se pide:

- (0.5 puntos) Calcular la matriz  $B = (A - I) \cdot (2I + 2A)$ .
- (1.5 puntos) Determinar el rango de las matrices  $A - I$ ,  $A^2 - I$  y  $A^3 - I$ .
- (1 punto) Calcular la matriz inversa de  $A^6$ , en caso de que exista.

*(Madrid - Matemáticas II - Septiembre 2017 - Opción B)*

### Solución.

a)  $B = (A - I) \cdot (2I + 2A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

b)  $\text{ran}(A - I) = \text{ran} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \left[ \begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ F_3 + F_2 \end{array} \right] = \text{ran} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$

$\text{ran}(A^2 - I) = \text{ran} \left[ \left( \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \right] = \text{ran} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$

$\text{ran}(A^3 - I) = \text{ran} \left[ \left( \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \right] = \text{ran} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$   
 $= \left[ \begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ F_3 + F_2 \end{array} \right] = \text{ran} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$

- c) Podríamos intentar sacar la potencia n-ésima  $A^n$ , pero no es necesario en este caso.

$$A^6 = (A^3)^2 = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 64 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow C^{-1} \odot \begin{pmatrix} 1/64 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

• Dada una matriz diagonal  $C = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \Rightarrow C^{-1} = \begin{pmatrix} 1/a & 0 & 0 \\ 0 & 1/b & 0 \\ 0 & 0 & 1/c \end{pmatrix}$

————— o —————

## Ejercicio 2 (3 puntos)

Se considera la función  $f(x) = \frac{e^{-x}}{x^2 + 1}$  y se pide:

- (1 punto) Obtener la ecuación de la recta tangente a la curva  $y = f(x)$  en el punto de abscisa  $x = 0$ .
- (1 punto) Estudiar la existencia de asíntotas horizontales y verticales de la función  $f(x)$  y, en su caso, determinarlas.
- (1 punto) Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y sus extremos relativos en el caso de que existan.

(Madrid - Matemáticas II - Septiembre 2017 - Opción B)

**Solución.**


a)  $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = f(x_0) = f(0) = 1$

$$f'(x) = -\frac{e^{-x} \cdot (x^2 + 2x + 1)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$m_r = f'(x_0) = f'(0) = -1$$

$$r \equiv y - y_0 = m_r \cdot (x - x_0)$$

$$y - 1 = -x \Rightarrow r \equiv y = -x + 1$$



b) ■ A. Vertical Como  $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \Rightarrow \nexists A.V.$

■ A. Horizontal

- $y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x}}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2 + 1} = \left[ \frac{\infty}{\infty} \right] \stackrel{L'Hop}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} = \left[ \frac{\infty}{\infty} \right]$

$$\stackrel{L'Hop}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = \left[ \frac{\infty}{\infty} \right] = +\infty \Rightarrow \nexists A.H. \text{ en } x \rightarrow -\infty$$

- $y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x \cdot (x^2 + 1)} = 0 \Rightarrow A.H. \text{ en } y = 0$

c)  $f'(x) = -\frac{e^{-x} \cdot (x^2 + 2x + 1)}{(x^2 + 1)^2} = 0 \begin{cases} e^{-x} = 0 \Rightarrow \nexists \text{ Sol.} \\ x^2 + 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1 \end{cases}$

	$(-\infty, -1)$	$(-1, +\infty)$
Signo $f'(x)$	-	-
$f(x)$	Decreciente ↓	Decreciente ↓

La función  $f(x)$  es *decreciente* en su dominio y tiene un *Punto de Inflexión* con tangente horizontal en  $x = -1$ .

### Ejercicio 3 (2 puntos)

Sea  $r$  la recta que pasa por los puntos  $P_1(3, 2, 0)$  y  $P_2(7, 0, 2)$ . Se pide:

- (1 punto) Hallar la distancia del punto  $Q(3, 5, -3)$  a la recta  $r$ .
- (1 punto) Hallar el punto de corte de la recta  $r$  con el plano perpendicular a  $r$  que pasa por el punto  $Q$

(Madrid - Matemáticas II - Septiembre 2017 - Opción B)

Solución.

$$r \equiv \begin{cases} P_1(3, 2, 0) \\ \vec{d}_r = \overrightarrow{P_1 P_2} = (4, -2, 2) \approx (2, -1, 1) \end{cases} \implies r \equiv \begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

a)  $\overrightarrow{P_1 Q} = (0, 3, -3)$

$$d(Q, r) = \frac{|\vec{d}_r \times \overrightarrow{P_1 Q}|}{|\vec{d}_r|} = \frac{\left| \begin{array}{ccc} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \end{array} \right|}{\sqrt{4+1+1}} = \frac{|(0, 6, 6)|}{\sqrt{6}} = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = 2\sqrt{3} \text{ u}$$

b)  $\pi \equiv \begin{cases} Q(3, 5, -3) \\ \vec{n}_\pi = \vec{d}_r = (2, -1, 1) \end{cases} \implies 2x - y + z + D = 0 \xrightarrow{Q \in r} D = 2$   
 $\implies \pi \equiv 2x - y + z + 2 = 0$

$$R = r \cap \pi \implies 2 \cdot (3 + 2\lambda) - (2 - \lambda) + \lambda + 2 = 0 \implies \lambda = -1 \implies R(1, 3, -1)$$

#### Ejercicio 4 (2 puntos)

Se considera el triángulo cuyos vértices son los puntos  $A(1, 3, -1)$ ,  $B(3, 1, 0)$  y  $C(2, 5, 1)$  y se pide:

a) (1 punto) Determinar razonadamente si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno.

b) (1 punto) Obtener las medidas de sus tres ángulos.

(Madrid - Matemáticas II - Septiembre 2017 - Opción B)

**Solución.**

- a) ■  $\overrightarrow{AB} = (2, -2, 1) \Rightarrow |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{9} = 3$   
■  $\overrightarrow{AC} = (1, 2, 2) \Rightarrow |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{9} = 3$   
■  $\overrightarrow{BC} = (-1, 4, 1) \Rightarrow |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

Por lo que  $\triangle ABC$  es *isósceles*.

b)  $\cos \hat{A} = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{|2 - 4 + 2|}{3 \cdot 3} = 0 \Rightarrow \hat{A} = 90^\circ$

Podríamos calcular de manera similar el resto de ángulos, pero como el triángulo es isósceles y rectángulo los otros ángulos serán  $\hat{B} = \hat{C} = 45^\circ$ .